

Aqua B.Braun

BG	Инструкции за употреба	2	
CZ	Návod k použití	3	
DE	Gebrauchsanweisung	4	
DK	Brugsanvisning	5	schwarz
EE	Kasutusjuhend	6	
ES	Instrucciones de uso	7	Format = 148 x 210 mm 24 Seiten
FI	Käyttöohje	8	
FR	Mode d'emploi	9	Läitus - - -
GB	Information for use	10	
HU	Használati utasítás	11	
IT	Istruzioni per l'uso	12	Irrigation Solution____75_GIF 75/12610272/0418
LT	Vartojimo instrukcija	13	GIF (A5-Booklet, 22-spr.)
LV	Lietošanas instrukcija	14	Production site: Crissier
MY	Maklumat penggunaan	15	
NL	Gebruiksaanwijzing	16	Font size: 9,0 pt.
NO	Brukerveiledning	17	
PL	Instrukcja zastosowania	18	
PT	Instruções de uso	19	
RO	Informații pentru utilizare	20	
SE	Bruksanvisning	21	
SI	Navodilo za uporabo	22	
SK	Informácia pre používateľa	23	

B|BRAUN

Aqua B. Braun

Разтвор за промиване,
стерилен и без ендотоксии

Композиция

1000 ml разтвор съдържат:
Вода за инжектиране 1000 ml

Показания

За промиване и почистване по време на хирургически интервенции.
За промиване на рани и изгаряния. За овлажняване на тампони, марли и превръзки на рани.
За изплакване и почистване на катетри за пикочни мехури.
За промиване и почистване при стоматологични грижи.
За изплакване и почистване на уреди и инструменти.
За пълнене на овлашнители на въздуха за вдишване (препоръчва се използване на контейнер най-малко от 100 ml).
За механично промиване на очите (препоръчва се използване на 30 ml контейнер).

Дозиране

Количеството течност зависи от клиничните условия.

Предозиране

Предозиране по време на промиване на рани и интраоперативно приложение може да доведе до абсорбиране на промиващата течност, което да доведе до хиперволемия във формата на хипотонична хиперхидрация (хипонатремия).

Симптомите на хиперхидрацията са главоболие, повръщане, беспокойство и дизориентация. В редки случаи може да се появят състояние, подобни на кома.

Мерки в случай на предозиране

Преустановяване на промиването, корекция на водния и електролитен баланс, в зависимост от определената клинична ситуация.

Предупреждения и предпазни мерки

Не използвайте за вливане.
Използвайте разтвора само ако печатът не е повреден и разтворът е бистър.
Отворените контейнери не бива да са пазят, останалите количества трябва да се изхвърлят.
Повторното използване на изделия за еднократна употреба създава потенциален риск за пациента или потребителя. То може да доведе до замърсяване и/или нарушаване на функционалните характеристики.
Замърсяването и/или ограничената функционалност на изделието могат да доведат до травми, заболяване или смърт на пациента.

Пазете извън обсега на деца.
Aqua B. Braun не бива да се използват за интратекални промиващи процедури.

Неблагоприятни странични ефекти

Няма известни

Срок на годност

Разтворът не бива да се използва след изтичане на срока на годност, посочен на етикета.

Дата на последно издание

0116

Aqua B. Braun

Roztok k oplachu,
sterilní a bez endotoxinů

Složení

1000 ml roztoku obsahuje:

Voda pro injekce

1000 ml

což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.

Skladujte mimo dosah dětí.

Produkt Aqua B. Braun nepoužívejte pro intratekální irigaci.

Indikace

K výplachu a čištění v průběhu chirurgického zákroku

K oplachu ran a popálenin

K zvlhčení tamponád ran, roušek a obvazů

K oplachům a čištění katetrů pro močový měchýř

K výplachům a čištění dutiny ústní ve stomatologii

K plnění zvlhčovačů dýchacích přístrojů

K oplachům a čištění nástrojů a přístrojů

Nežádoucí vedlejší účinky

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Přípravek nesmí být použit po uplynutí data použitelnosti uvedeném na obale.

Datum poslední revize

0116

Dávkování

Množství vody závisí na druhu onemocnění.

Předávkování

Předávkování v průběhu výplachu rány a podání při operaci může vést k vstřebání vody, které může způsobit hypervolémii ve formě hypotonické hyperhydratace (hyponatrémie).

Příznaky hyperhydratace jsou bolest hlavy, nausea, neklid a desorientace. V závažných případech se mohou vyskytnout stavy podobné komatu.

Protiopatření v případech předávkování

Přerušení výplachu, korekce rovnováhy vody a elektrolytů podle konkrétní klinické situace.

Varování a bezpečnostní opatření

Nepoužívejte k infuzi.

Použijte roztok pouze má-li neporušenou pojistkovou uzávěru a je-li čirý.

Otevřené nádoby nesmí být uloženy pro další použití, zbylý obsah je nutno vylít.

Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení,

Aqua B. Braun

**Spülösung,
steril und endotoxinfrei**

Zusammensetzung

1000 ml Lösung enthalten:
Aqua ad injectabilia

1000 ml

Anwendungsgebiete

Zur Spülung und Reinigung bei operativen Eingriffen
Zur Spülung von Wunden und Verbrennungen
Zur Anfeuchtung von Wundtamponaden, Tüchern und Verbänden
Zur Spülung und Reinigung von Blasenkathetern
Zur Spülung und Reinigung bei Stomaversorgung
Zur Spülung und Reinigung von Instrumenten und Zubehör
Zur Befüllung von Atemluftbefeuchtungsgeräten (Behälter ab 100 ml werden empfohlen)
Zur mechanischen Augenspülung (30 ml Behälter werden empfohlen).

Dosierung

Die Flüssigkeitsmenge richtet sich nach der jeweiligen Situation.

Überdosierung

Bei einer Überdosierung im Rahmen von Wundspülungen und intraoperativer Anwendung kann es zur Absorption von Spülflüssigkeit kommen, die zu einer Hypervolämie im Sinne einer hypotonen Hyperhydratation (Hyponatriämie) führen kann. Symptome einer Hyperhydratation sind Kopfschmerz, Brechreiz, Unruhe und Desorientierung. In schweren Fällen kann es zu komaähnlichen Zuständen kommen.

Gegenmaßnahmen bei Überdosierung

Abbruch der Spülung, Korrektur des Wasser- und Elektrolythaushalts entsprechend der jeweiligen klinischen Situation.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht zur Infusion verwenden.
Lösung ist nur zu verwenden, wenn Verschluß unverletzt und Lösung klar ist.
Angeborene Behältnisse dürfen nicht aufbewahrt werden, Restmengen müssen verworfen werden.
Die Wiederverwendung von Geräten für den einmaligen Gebrauch stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben. Kontamination und/oder eingeschränkte Funktionalität des Gerätes können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Aqua B. Braun darf nicht für intrathekale Spülverfahren verwendet werden.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Sind nicht bekannt.

Verfalldatum

Die Lösung darf nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

Datum der letzten Überarbeitung

0116

Aqua B. Braun

**Skyllevæske,
steril og endotoksfri**

Indhold

1000 ml indeholder:

Aqua ad inyectabilia

1000 ml

Kontaminering af og/eller reduceret funktion i remediet kan medføre skade, sygdom eller død for patienten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Aqua B. Braun må ikke anvendes til intratekale skylningsprocedurer.

Indikationer

Til skyldning og rensning under kirurgiske indgreb

Til skyldning af sår og brandsår

Til fugtning af sårtamponader, klæde og forbindinger

Til skyldning og rensning af blærekatetre

Til skyldning og rensning ved stomabehandling

Til skyldning og rensning af instrumenter og udstyr

Til fyldning af respirationsluftbefugtere (brug af beholder på 100 ml eller større anbefales)

Til mekanisk skyldning af øjnene (brug af beholder på 30 ml anbefales)

Bivirkninger

Ingen kendte.

Anvendes inden

Se beholderens etiket

Dato for sidste revision

0116

Dosering

Mængden af væske afhænger af situationen.

Overdosering

Overdosering i forbindelse med sårskyldning og intra-operativ applikation kan føre til absorbering af skyllevæsken, hvilket kan føre til hypervolaemia i form af hypoton hyperhydration.

Modtræk i tilfælde af overdosering

Afbryd skyldningen. Korrektion af væske- og elektrolytbalance afhængig af den specifikke kliniske situation.

Advarsler og forsigtighedsregler

Må ikke anvendes til infusion. Må kun anvendes såfremt væsken er klar, og plomberingen er ubrudt.

Åbne beholdere må ikke gemmes.

Overskydende væske skal fjernes.

Genanvendelse af engangsremedier medfører en potentiel risiko for patienten og bruger. Det kan føre til kontaminering og/eller reduceret funktion.

Aqua B. Braun

Loputuslahused,
steriilne ja endotoksiinivaba

Koostis

1000 ml lahust sisaldab:
Süstevesi 1000 ml

Hoitatused ja ettevaatusabinõud

Mitte kasutada infusiooniks.
Kasutada ainult juhul kui lahust on selge ja kork vigastusteta.
Avatud konteinerid mitte säilitada, allesjääenud lahused tuleb hävitada.
Ühekordsete seadmete uuestikasutamine tekitab patsiendile või kasutajale ohtu. See võib põhjustada seadme saastumist ja/või funktsionihäireid. Seadme saastumine ja/või funktsionihäired võivad põhjustada patsiendi vigastusi, haigusi või surma.
Hoida lastele kättesaadatus kohas.
Aqua B. Braun ei tohi kasutada intratekaalsetel loputusprotseduuridel.

Näidustused

Puhastamiseks ja loputamiseks kirurgiliste protseduuride ajal
Haavade ja pöletuste loputamiseks
Haavatampaanide, sidemete ning haavakatete niisutamiseks
Pöiekateetrite loputamiseks ja puhastamiseks
Stoomivahendite loputamiseks ja puhastamiseks
Seadmete ja instrumentide loputamiseks ja puhastamiseks
Respiraatorite õhuniisutajate täitmiseks (soovitatav on kasutada 100 ml või suuremat konteinerit)
Silmade mehhaaniliseks loputamiseks (soovitatav kasutada 30 ml konteinerit)

Kõrvaltoimed

Ei ole teada

Säilivusaeg

Mitte kasutada lahust peale pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu

Annustamine
Lahuse kogus sõltub kliinilistest tingimustest

Viimati kooskõlastatud

0116

Üleannustamine

Üleannustamine haavade loputamisel ja operatsiooniaegsel kasutamisel võib põhjustada loputuslahuse absorptsiooni, mis võib viia hüperoleemiani hüpotoonilise hüperhüdratsioonina (hüponatreemia).
Hüperhüdratsiooni sümpтомiteks on peavalu, iiveldus, rahutus ja desorientatsioon.
Rasketel juhtudel võivad tekkida koomalaadsed seisundid.

Vastumeetmed üleannustamise korral

Loputuse katkestamine, vee ja elektrolüütide tasakaalu taastamine vastavalt antud kliinilisele seisundile.

Aqua B. Braun

Solución para irrigación,
estéril y libre de endotoxinas

Composición

1000 ml de solución contienen:
Agua para inyectables c.s.

Indicaciones

Para irrigación y limpieza durante una intervención quirúrgica
Para irrigación de heridas y quemaduras
Para humedecer heridas cerradas, vendajes
Para enjuague y limpieza de los catéteres para vejiga
Para irrigación y limpieza en cuidados de estomas
Para enjuague y limpieza del equipo e instrumental
Para llenar humidificadores respiratorios (se recomienda utilizar contenedor de 100 ml o superior)
Para irrigación mecánica de los ojos (se recomienda utilizar contenedor de 30 ml).

Dosis

La cantidad de solución a irrigar depende de cada situación particular.

Sobredosis

Una sobredosis durante la irrigación de una herida y una aplicación intra-operativa puede llevar a la absorción del fluido para irrigación. Esto puede provocar una hipervolemia en forma de hiperhidratación hipotónica (hiponatremia). Dolores de cabeza, náuseas, inquietud y desorientación son síntomas de una hiperhidratación. En casos graves pueden acontecer estados similares a coma.

Medidas en caso de sobredosis

Interrumpir la irrigación, corregir los balances de agua y electrolítico, con dependencia de cada situación clínica particular.

Advertencias y precauciones

No utilizar para infusión.
La solución sólo debe utilizarse si el precinto está intacto y la solución es clara.
Una vez abierto, el remanente debe desecharse.
La reutilización de dispositivos de un solo uso supone un riesgo potencial para el paciente o el usuario. Puede producir contaminación o mal funcionamiento de la capacidad funcional.
La contaminación o la limitación en el funcionamiento del dispositivo pueden ocasionar lesión, enfermedad o incluso la muerte del paciente.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Aqua B. Braun no debe emplearse para procedimientos de irrigación intratecal.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Caducidad

La solución no debe ser utilizada después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Fecha de la última revisión

0116

Aqua B. Braun

Huuhteluneste,
sterili ja endotoksiiniton

Koostumus

1000 ml huuhtelunestettä

sisältää:

Injektionesteisiin käytettävä vesi

1000 ml

Indikaatiot

Huuhteluun ja puhdistukseen kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä
Haavojen ja palovammojen huuhteluun
Haavanhoitossa liinojen kostuttamiseen
Rakkokatetriin huuhteluun ja puhdistamiseen
Huuhteluun ja puhdistukseen avannehoidossa
Instrumenttien ja laitteiden huuhteluun sekä puhdistukseen
Hengitysilman kostuttajien täytyöön (suositellaan vähintään 100 ml pakkauksen käyttöä)
Silmähuuhteena (30 ml pakkaus)

Annostus

Tarvittava huuhtelunesteen määrä riippuu tilanteesta.

Yliannostus

Yliannostus haavan huuhtelun tai muun toimenpiteen yhteydessä voi johtaa huuhtelunesteen imetyymiseen. Tästä voi seurata hypervolemia hypotonisen hyperhydraation (hyponatremia) muodossa. Hyperhydraation oireita ovat päänsärky, pahoinvohti, levottomuus ja sekavuus. Vakavissa tapauksissa saattaa esiintyä koomaa muistuttavia tiloja.

Toimenpiteet yliannostuksen yhteydessä

Huuhtelunesteen käytön keskeyttäminen, neste- ja elektrolyyttitasapainon korjaaminen riippuen potilaan kliinisestä tilasta.

Varoitukset ja varotoimet

Valmistetta ei saa käyttää infuusionesteenä.

Varmista ennenavaamista, että pakaus on vahingoittumaton ja liuos kirkasta.

Avattua pakkausta ei tule säilyttää, käytämättä jänyt liuos tulee hävittää.

Kertakäyttötuotteiden käytäminen uudelleen voi vaarantaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuden. Tämä saattaa johtaa kontaminaatioon ja/tai toiminnallisuden heikkenemiseen. Laitteen kontaminoituminen ja/tai rajoittunut toiminta saattavat aiheuttaa potilaan vahingoittumisen, sairastumisen tai kuoleman.

Ei lasten ulottuville.

Aqua B. Braun ei saa käyttää intratekaalisiin huuhtelutoimenpiteisiin.

Haittavaikutukset

Valmisteella ei ole tunnettuja haittavaikutuksia.

Säilyvyys

Valmistetta ei tule käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Teksti tarkastettu

0116

Aqua B. Braun

Solution d'irrigation,
stérile et exempt d'endotoxines

Composition

Eau p.p.i. 1000 ml

Indications

Irrigation et lavage lors d'interventions chirurgicales
Irrigation des plaies et des brûlures humidification des plaies, champs opératoires et pansements
Irrigation et lavage des cathéters vésicaux
Irrigation et lavages stomachaux
Lavage du matériel chirurgical
Remplissage des réservoirs des respirateurs (l'utilisation d'un conteneur de volume supérieur ou égal à 100 ml est recommandée)
Irrigation oculaire (l'utilisation de l'Ecolav 30 ml est recommandée)

Posologie

Les quantités de solution utilisées dépendent de la situation.

Surdosage

Le surdosage lors de l'irrigation des plaies ou lors d'applications per-opératoires peut conduire à la résorption de la solution. Ceci peut entraîner une hypervolémie sous la forme d'une hyperhydratation hypotonique (hyponatrémie). Maux de tête, nausées, vomissements et désorientation sont des symptômes de l'hyperhydratation. Dans des cas sévères, il peut y avoir apparition de coma.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Arrêt de l'irrigation.
Correction de la balance hydroélectrolytique.

Mises en garde et précautions

Ne pas injecter.
Vérifier l'intégrité du contenant et la limpidité de la solution.
Jeter tout contenant partiellement utilisé.
La réutilisation d'éléments à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur.
L'élément peut être contaminé et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures et des maladies potentiellement mortelles.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Aqua B. Braun ne doit pas être utilisé dans des procédures d'irrigation intrathécale.

Effets indésirables

Pas d'effets indésirables connus.

Date de péremption

La solution ne doit pas être utilisée après la date figurant sur l'étiquette.

Date de révision

0116

Aqua B. Braun

**Sterile Water for Irrigation
Irrigation solution,
sterile and endotoxin-free**

Composition

1000 ml solution contain:

Water for Injection

1000 ml

Indications

For irrigation and cleansing during surgical intervention

For irrigation of wounds and burns

For moistening wound tamponades, cloths and dressings

For rinsing and cleansing of bladder catheters

For irrigation and cleansing in stoma care

For rinsing and cleansing of instruments and equipment

For filling respiratory air humidifiers (the use of container equal or higher than 100 ml is recommended)

For mechanical irrigation of the eyes (the use of 30 ml container is recommended)

Dosage

The amount of fluid depends on the clinical condition.

Overdosage

Overdosage during wound irrigation and intra-operative application can lead to absorption of irrigation fluid, that can lead to hypervolaemia in the form of hypotonic hyperhydration (hyponatraemia).

Headache, nausea, restlessness and disorientation are symptoms of hyperhydration. In severe cases coma-like states can occur.

Countermeasures in cases of overdosage

Discontinuation of irrigation, correction of the water and electrolyte balance depending on the particular clinical situation.

Warnings and precautions

Do not use for infusion.

Only use the solution if the seal is undamaged and the solution is clear.

Opened containers must not be saved, quantities left over must be discarded.

Re-use of single-use devices creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability. Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

Store out of reach of children.

Aqua B. Braun must not be used for intrathecal irrigation procedures.

Adverse side effects

None are known.

Expiry date

The solution must not be used after the expiry date given on the label.

Date of last revision

0116

Aqua B. Braun

Öblítőoldat,
steril és endotoxin-mentes

Összetétel

1000 ml oldat tartalma:
injekció céljára szolgáló víz; 1000 ml.

Javallatok

Öblítés és tisztítás sebészeti beavatkozás során.
Sebek és égések öblítése.
Seb-tamponádok, törlők és izolálókendők nedvesítése.
Hólyag katéterek átöblítése és tisztítása.
Öblítés és tisztítás a sztóma-ellátásban.
Műszerek és eszközök mosása és tisztítása.
Légúti párásító készülékek feltöltése. (100 ml, vagy ennél nagyobb kiszerelés használata javasolt)
Szemek mechanikai öblítése (30 ml-es kiszerelés használata javasolt)

Adagolás

Az alkalmazandó folyadék mennyisége a klinikai kép függvénye.

Túladagolás

A sebek öblítése és a műtét közbeni alkalmazás során történő túladagolás az öblítő oldat felszívódása folytán hipotóniás hiperhidráció (hiponatrémia) képében jelentkező hipervolémiahoz vezethet.
A hiperhidráció tünetei: fejfájás, hányinger, nyugta-lanság és zavarosság.
Súlyos esetekben kóma-szerű állapotok fordulhatnak elő.

Ellenintézkedések túladagolás eseteiben

Az öblítés megszakítása, a víz és elektrolit egyensúly rendezése (az adott klinikai kép függvényében).

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Ne használja infúzió céljára.

Az oldatot csak akkor használja fel, ha az tiszta, a tároló edény pedig sértetlen.

A felnyitott tároló edényeket később felhasználni tilos, a fennmaradó oldat mennyiség pedig megsemmisítendő.

Az egyszeri használatra szolgáló eszközök újbóli felhasználása potenciális veszélyt jelent a beteg vagy a felhasználó számára. A fertőzésveszély mellett az is előfordulhat, hogy az újbóli felhasználáskor az eszköz nem működik megfelelően. A fertőzés, illetve az eszköz nem megfelelő működése a beteg sérülését, egészségkárosodását vagy halálát okozhatja. Oly módon tárolandó, hogy gyermek ne férhessen hozzá.

Az Aqua B. Braun termék nem használható fel intrathecalis irrigációhoz.

Nem kívánatos mellékhatások

Nem ismeretesek.

Lejárat idő

A címkén feltüntetett lejárat idő után az oldatot felhasználni tilos.

Utolsó felülvizsgálat dátuma

0116

Aqua B. Braun

Soluzione per irrigazione,
sterile e privo di endotossine

Composizione

1000 ml di soluzione contengono:

Acqua p.p.i.

1000 ml

Indicazioni

Per irrigazione e lavaggio durante interventi chirurgici
Per irrigazione di ferite e ustioni
Per inumidimento di medicazioni, tessuti e vestiti
Per la pulizia e il risciacquo di cateteri vescicali
Per la pulizia e il risciacquo di stomie
Per la pulizia e il risciacquo di strumenti e apparecchiature
Per il riempimento di umidificatori dell'aria di respirazione (si consiglia l'uso del contenitore di volume uguale o superiore a 100 ml)
Per irrigazione meccanica degli occhi (si consiglia l'uso del contenitore da 30 ml)

Avvertenze e precauzioni

Non usare per infusioni.
Usare solo se il sigillo è integro e la soluzione è limpida.
Conservare in contenitori chiusi; le quantità residue devono essere eliminate.
Il riutilizzo di dispositivi monouso crea un potenziale rischio sia per il paziente che per l'operatore. Può provocare contaminazione e/o riduzione della funzionalità del dispositivo, che possono dar luogo a lesioni, malattie o morte del paziente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Aqua B. Braun non deve essere utilizzato per procedure di irrigazione intratecale.

Controindicazioni

Non note.

Data di scadenza

La soluzione non deve essere utilizzata dopo la data di scadenza riportata in etichetta.

Data dell'ultima revisione

0116

Dosaggio

La quantità di soluzione da utilizzare varia a seconda dei casi.

Sovradosaggio

Il sovradosaggio durante l'irrigazione delle ferite e l'applicazione intra-operatoria può portare all'assorbimento della soluzione di irrigazione che a sua volta può causare ipervolemia sotto forma di iperidratazione ipotonica (iponatremia). Cefalea, nausea, irrequietezza e disorientamento sono sintomi di iperidratazione. Nei casi gravi si possono avere stati simili al coma.

Interventi in caso di sovradosaggio

Interruzione dell'irrigazione, correzione del bilancio idro-elettrolitico, a seconda della particolare situazione clinica.

LT – Vartojimo instrukcija

Aqua B. Braun

Irigacinis tirpalas,
sterilus ir kurio sudėtyje nėra endotoksinų

Sudėtis

1000 ml tirpalo yra:
injekcijų vandens

1000 ml

galimas pavojus pacientui ar vartotojui. Jie gali būti užkrėsti ir (arba) veikti netinkamai. Naudojant užkrėstą ir (arba) ribotai veikiant prietaisą pacientas gali būti sužalotas, susirgti ar net mirti.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
„Aqua B. Braun“ negalima naudoti intratekalinio praplovimo procedūroms.

Indikacijos:

Vartoti atliekant chirurgines operacijas;
Žaizdoms ir nudegimams plauti;
Atliekant žaizdų tamponadą, tvarsčiams ir tamponams drékinti;
Šlapimo pūslės kateteriams plauti;
Vartoti stomos priežiūrai ir plovimams;
Instrumentams bei įrangai plauti ir valyti;
Respiratoriaus drékintuvams užpildyti (patartina naudoti 100 ml arba didesnes pakuotes);
Akims mechaniskai praplauti (patartina naudoti 30 ml pakuotę).

Dozavimas

Skysčio kiekis priklauso nuo klinikinės situacijos.

Nepageidajamas poveikis

Nežinomas.

Tinkamumo laikas

Tinkamumo laikas nurodytas ant pakuočės. Jam pasibaigus tirpalo vartoti negalima.

Paskutinės peržiūros data

0116

Perdozavimas

Dėl perdozavimo plaunant žaizdas ir atliekant chirurgines operacijas galima irrigacinio tirpalo absorbacija. Tai gali sukelti hipotoninę (hiponatreminę) hipervolemiją. Galvos skausmas, pykinimas, nerimas, orientacijos sutrikimas yra hiperhidratacijos simptomai. Sunkiai atvejais gali ištikti koma.

Priemonės esant perdozavimui

Nutraukti irrigaciją, koreguoti vandens ir elektrolitų balansą pagal klinikinę situaciją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nevartoti infuzijoms.

Tirpalas tinkamas vartoti, jeigu plomba nepažeista, o pats tirpalas – skaidrus.

Nelaikyti atidarytų pakuočių.

Nesuvartotą tirpalą išpilti.

Pakartotinai naudojant vienkartinius prietaisus

Aqua B. Braun

**Šķīdums skalošanai,
sterils un nesatur endotoksīnus**

Sastāvs

1000 ml šķīduma satur:

Ūdeni injekcijām

1000 ml

atlikušais šķīduma daudzums jāizlej.

Vienreizējai lietošanai paredzētu ierīču atkārtota lietošana var radīt risku pacientam vai ierīces lietotājam. Tā var izraisīt kontamināciju un/ vai funkcionālās spējas traucējumus. Ierīces kontaminācija un/vai ierobežota funkcionālā spēja var izraisīt pacientam kaitējumu, slimību vai nāves iestāšanos.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Aqua B. Braun nedrīkst izmantot intraheālām skalošanas procedūrām.

Indikācijas

Skalošanai un tīrišanai ķirurģisku manipulāciju laikā.

Brūcu un apdegumu skalošanai.

Brūču mitrināšanai.

Katetru tīrišanai un skalošanai.

Skalošanai un tīrišanai stomu aprūpē.

Instrumentu un aprīkojuma skalošanai un tīrišanai.

Gaisa mitrinātāju uzpildīšanai

(leteicams lietot 100 ml vai lielākus flakonus).

Mehāniskai acu skalošanai (leteicams lietot 30 ml flakonus).

Devas

Pielietojamā šķīduma daudzums atkarīgs no klīniskā stāvokļa.

Blaknes

Neviena nav zināma.

Derīguma termiņš

Nelietot šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kurš norādīts uz etiketes.

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

0116

Pārdozēšana

Pārdozēšana brūcu skalošanas un operāciju laikā var izsaukt skalojamā šķīduma absorbciju, kura var izraisīt hipervolēmiju hipotoniskas hiperhidratācijas formā.

Galvassāpes, nelabums, nemierīgums un dezorientācija ir hiperhidratācijas simptomi. Dažos gadījumos var iestāties komai līdzīgs stāvoklis.

Pretpasākumi pārdozēšanas gadījumā

Pārtraukt skalošanu, koriģēt ūdens un elektrolītu balansu atkarībā no esošās klīniskās ainas.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Nelietot infūzijām.

Nelietot, ja flakona aizvākojums ir bojāts un tajā esošais šķīdums nav dzidrs.

Atvērtos flakonus neuzglabāt vēlākai lietošanai,

Aqua B. Braun

Air Steril untuk Pengairan

Larutan pengairan,
steril dan bebas endotoksin

Kandungan

1000 ml larutan mengandungi:

Air untuk Suntikan

1000 ml

Indikasi

Untuk pengairan dan pembersihan ketika pembedahan

Untuk pengairan ke atas luka dan lecur

Untuk melembutkan tamponad luka, kain dan dresing

Untuk membilas dan membersih kateter pundi

Untuk pengairan dan pembersihan dalam penjagaan stoma

Untuk membilas dan membersih instrumen dan peralatan

Untuk mengisi pelembap udara pernafasan (anda disaran menggunakan bekas sama dengan atau lebih tinggi daripada 100 ml)

Untuk pengairan teknikal ke atas mata (anda disaran menggunakan bekas 30 ml)

Dos

Amaun cecair bergantung pada keadaan klinikal.

Lampau dos

Lampau dos ketika pengairan luka dan penggunaan intra-bedah boleh menyebabkan penyerapan cecair pengairan, ia boleh membawa kepada hipervolemia dalam bentuk hiperhidrasi hipotonik (hiponatremia).

Sakit kepala, loya, resah, nanar adalah tanda-tanda hiperhidrasi. Dalam kes yang teruk, keadaan seperti koma boleh berlaku.

Langkah pencegahan jika berlaku lampau dos

Menghentikan pengairan, membetulkan air dan baki elektrolit bergantung pada keadaan klinikal tertentu.

Amaran dan langkah berjaga-jaga

Jangan guna untuk infusi.

Hanya guna larutan jika penutup tidak rosak dan larutan dalam keadaan jernih.

Bekas yang telah dibuka tidak boleh disimpan, baki larutan hendaklah dibuang. Menggunakan semula peranti guna sekali menyebabkan potensi risiko ke atas pesakit atau pengguna. Ia boleh mengakibatkan pencemaran dan/atau gangguan kemampuan fungsi. Pencemaran dan/atau fungsi peranti yang terhad boleh mengakibatkan kecederaan, kesakitan atau kematian ke atas pesakit.

Jauhi daripada kanak-kanak.

Aqua B. Braun tidak boleh digunakan untuk prosedur pengairan intratekal.

Kesan sampingan yang teruk

Tidak diketahui.

Tarikh tamat tempoh

Larutan tidak boleh digunakan selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada label.

Tarikh semakan terakhir

0116

Authorised representative/ Wakil berdaftar:

B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Bayan Lepas Free Industrial Zone,

11900 Penang, Malaysia.

www.bbraun.com

En - Please do not make any decisions of medical relevance before consulting your health care provider

Ms - Jangan buat sebarang keputusan berkaitan dengan perubatan sebelum mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan anda.

Aqua B. Braun

Spoelvloeistof,
steriel en endotoxinevrij

Samenstelling

1000 ml vloeistof bevat:
Water voor injecties 1000 ml

Indicaties

Voor het spoelen en schoonmaken tijdens chirurgische ingrepen
Voor het spoelen van (brand)wonden
Voor het bevochtigen van wondverband en gazen
Voor het spoelen en schoonmaken van blaascatheters
Voor het spoelen en schoonmaken van stoma's
Voor het spoelen en schoonmaken van instrumenten en apparatuur
Voor het vullen van bevochtigingsapparatuur (het gebruik van een container van 100 ml of meer wordt aanbevolen)
Voor het mechanisch spoelen van de ogen (het gebruik van een 30 ml flacon wordt aanbevolen)

Dosering

De hoeveelheid vloeistof hangt af van de toepassing.

Overdosering

Overdosering tijdens wondspoeling en intra operatieve toepassing kan aanleiding geven tot absorptie van de spoelvloeistof, wat kan leiden tot hypervolemie in de vorm van een hypotonische hyperhydratie (hyponatriëmie).
Hoofdpijn, misselijkheid, onrust en desoriëntatie zijn symptomen van hyperhydratie.
In ernstige gevallen kan een comateus beeld ontstaan.

Bij overdosering

Stoppen met het spoelen, correctie van de water- en electrolytenbalans afhankelijk van klinische situatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken als infusievloeistof.
Vloeistof alleen gebruiken indien de vloeistof helder en de verpakking ongeschonden is.
Voor éénmalig gebruik, eventuele restanten dienen vernietigd te worden.
Het opnieuw gebruiken van producten voor eenmalig gebruik creëert een mogelijk risico voor de patiënt of de gebruiker. Het kan leiden tot contaminatie en/of beschadiging van het functionele vermogen. Contaminatie en/of een beperkte functionaliteit van het product kan leiden tot letsel, ziekte of de dood van de patiënt.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aqua B. Braun niet gebruiken voor intrathecaal spoelen.

Bijwerkingen

Niet bekend.

Houdbaarheid

Niet gebruiken na de op de verpakking aangegeven datum.

Datum laatste herziening

0116

Aqua B. Braun

Skyllevæske,
steril og endotoksfri

Virkestoff og styrke

1000 ml væske inneholder:
sterilt vann til 1000 ml

kontaminering og/eller nedsatt funksjonsevne.
Kontaminering og/eller begrenset funksjonsevne
for enheten kan føre til skade, sykdom eller død
hos pasienten.

Indikasjoner

Skylling og vasking ved kirurgiske inngrep
Skylling av sår og brannskader
Fukting av sårtamponger, bandasjer og kompresser
Skylling og vasking av blærekateter
Skylling og vasking ved behandling av stomier
Rensning og vasking av instrumenter og utstyr
Fylling av respiratoriske luftfukttere (det er
anbefalt å bruke pakninger på 100 ml eller mer)
Mekanisk skylling av øyne (det er anbefalt å bruke
pakning på 30 ml)

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Aqua B. Braun må ikke brukes til intratekale
skylleprosedyrer.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Holdbarhet

Holdbarhetsdato er angitt på den enkelte pakning.

Siste oppdatering

0116

Dosering

Avhengig av bruksområdet.

Overdosering

Overdosering ved sårskylling eller ved tilførsel
peroperativt, kan føre til absorpsjon av
skyllevæsker. Dette kan føre til hypervolemi og
hypoton
hydrering (hyponatremi).
Symptomer er hodepine, kvalme, uro og forvirring.
I alvorlige tilfeller kan kompliknende tilstander
oppstå.

Tiltak ved overdosering

Avbryt behandlingen, korriger pasientens væske-
og elektrolytt-balanse.

Advarsler og forholdsregler

Må ikke infunderes. Løsningen kan kun brukes når
forseglingen er ubrott og løsningen er klar.
Skyllevæsken må brukes innen 1 døgn etter
anbrudd.
Gjenbruk av enheter til engangsbruk medfører
risiko for pasient eller bruker. Det kan føre til

Aqua B. Braun

Roztwór do przepłukiwania,
jałowy i niezawierający endotoksyn

Skład

1000 ml roztworu zawiera:
woda do wstrzyknięć 1000 ml

Wskazania

Przepłukiwanie i oczyszczanie podczas interwencji chirurgicznej.
Przemywanie ran i oparzeń.
Zwilżanie tamponad i opatrunków na ranach.
Przepłukiwanie i oczyszczanie cewników dopęcherzowych.
Przepłukiwanie i oczyszczanie w opiece stomijnej.
Napełnianie nawilżaczy powietrza (zalecane jest zastosowanie pojemnika 100 ml lub większego).
Mechaniczne przemywanie oczu (zalecane jest zastosowanie pojemnika 30 ml).

Dozowanie

Ilość płynu zależy od stanu klinicznego.

Przedawkowanie

Przedawkowanie podczas przemywania ran oraz w zastosowaniach w trakcie zabiegów operacyjnych może prowadzić do wchłaniania zastosowanego płynu, co z kolei może wywołać hiperwolemię w postaci hipotonicznego przewodnienia (niedobór sodu we krwi). Przewodnienie może objawiać się bólem głowy, nudnością, niepokojem i dezorientacją. W poważnych przypadkach mogą wystąpić stany śpiączkowe.

Środki zaradcze w przypadku przedawkowania
Wstrzymanie przepłukiwania, skorygowanie równowagi wodnej i elektrolitowej w zależności od konkretnego stanu klinicznego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować do infuzji.
Stosować tylko wtedy, gdy roztwór jest klarowny i zamknięcie pojemnika jest nie-naruszone.
Otwartych pojemników nie wolno przechowywać; pozostały płyn należy usunąć.
Ponowne zastosowanie urządzeń jednorazowego użytku stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i użytkownika. Może to doprowadzić do skażenia i/lub upośledzenia funkcjonowania. Skażenie i/lub ograniczona funkcjonalność urządzenia może spowodować obrażenia, chorobę lub śmierć pacjenta.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Aqua B. Braun nie można stosować do irrigacji dooponowej.

Działania uboczne

Nie stwierdzono.

Data ważności

Roztwór nie należy używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie.

Data ostatniej aktualizacji ulotki

0116

Aqua B. Braun

Solução de irrigação,
estéril e livre de endotoxinas

Composição

1000 ml de solução contém:

Água bidestilada para
preparações injectáveis

1000 ml

Indicações terapêuticas

Para irrigação e lavagem durante intervenções cirúrgicas
Para irrigação de feridas e queimaduras
Para humedecer feridas e tecidos
Para desobstrução e lavagem de catéteres vesicais
Para irrigação e lavagem de estomos
Para lavagem de instrumentos e equipamentos
Para enchimento de humidificadores de ar
(recomenda-se o uso de apresentações com volume igual ou superior a 100 ml)
Para lavagem ocular (recomenda-se o uso da apresentação de 30 ml)

Posologia usual

O volume de solução a utilizar depende da situação em particular.

Sobredosagem

A sobredosagem durante a lavagem de feridas e a aplicação intra-operatória pode levar à absorção da solução de irrigação resultando em hipervolémia na forma de hiperhidratação hipotônica (hiponatremia). Cefaleias, náuseas, agitação e desorientação são sintomas de hiperhidratação. Em situações críticas podem ocorrer estados comatosos.

Medidas a adoptar em casos de sobredosagem

Parar a irrigação e fazer correção do equilíbrio hídrico-electrolítico de acordo com a situação clínica do doente.

Avisos e precauções

Não utilizar em perfusão intravenosa.

Rejeitar a solução caso se apresente turva ou com sedimento ou se o recipiente não estiver intacto.

Depois de aberta a embalagem, a solução deve ser utilizada imediatamente; rejeitar qualquer volume residual da solução.

A reutilização dos dispositivos de utilização única cria um risco potencial para o doente ou para o utilizador. Poderá levar à contaminação e/ou insuficiência na capacidade funcional. A contaminação e/ou a limitação da funcionalidade do dispositivo poderá provocar lesões, doença ou morte do doente.

Manter fora do alcance das crianças.

O Aqua B. Braun não deve ser utilizado em procedimentos de irrigação intratecal.

Efeitos indesejáveis

Não existem efeitos indesejáveis associados ao uso desta solução desde que a sua aplicação seja feita de modo correcto.

Verificar o prazo de validade inscrito na embalagem. Não utilizar após expirar o prazo de validade indicado no rótulo.

Data da última revisão do folheto:

0116

Aqua B. Braun

Soluție de irigare,
sterilă și fără endotoxină

Compoziție

1000 ml de soluție conțin:
Apă pentru injecție

1000 ml

Indicații

Pentru irigare și dezinfecțare în timpul intervențiilor chirurgicale
Pentru irigarea rânilor și a arsurilor
Pentru umezirea tampoanelor pentru râni, materialelor textile și a pansonamentelor
Pentru clătirea și dezinfecțarea cateterelor pentru vezică
Pentru irigare și dezinfecțare în tratarea stomelor
Pentru clătirea și dezinfecțarea instrumentelor și echipamentului
Pentru umplerea umezitoarelor de aer ale respiratoarelor (se recomandă utilizarea unui recipient cu volum egal sau mai mare de 100 ml)
Pentru irigarea mecanică a ochilor (se recomandă utilizarea unui recipient de 30 ml)

Dozare

Cantitatea de lichid depinde de starea clinică.

Supradozare

Supradozarea în timpul irigării rânilor și aplicarea în timpul operației poate duce la absorția lichidului de irigare, ceea ce poate duce la hipervolemie sub forma hiperhidratării hipotonice (hiponatremie)

Durerea de cap, gheță, anxietatea șidezorientarea sunt simptomele hiperhidratării.
În forme grave se pot instala stări asemănătoare comei.

Contramăsuri în caz de supradozare

Întreruperea irigării, corecție a echilibrului cantităților de apă și electrolit în funcție de starea clinică specifică.

Avertizări și măsuri de precauție

Nu utilizați pentru injectare.
Utilizați soluția doar dacă izolația nu este deteriorată și dacă soluția este limpă.
Recipientele deschise trebuie să fie păstrate, iar cantitățile rămase trebuie să fie înăbandurate.
Reutilizarea dispozitivelor de unică folosință creează un risc potențial pentru pacient sau pentru utilizator. Aceasta poate duce la contaminare și/sau la deteriorarea capacitații funcționale. Contaminarea și/sau funcționalitatea limitată a dispozitivului poate duce la vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
Nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Aqua B. Braun nu trebuie utilizată pentru procedurile de irigare intratecale.

Efecte secundare adverse

Nu se cunosc.

Data expirării

Soluția nu trebuie utilizată după data expirării marcată pe etichetă.

Data ultimei verificări

0116

Aqua B. Braun

Spolvätska,
steril och endotoxinfri

Innehåll

1000 ml innehåller:

Vatten till injektion

Indikationer

För spolning och rengöring under kirurgiska
ingrepp
För spolning av sår och brännskador
För befolkning av sårtamponader och kompresser
För sköljning och rengöring av blåskatetrar
För spolning och rengöring under stomivård
För sköljning och rengöring av instrument och
utrustning
För påfyllning av befolkningssapparatur (volym
100 ml och däröver rekommenderas)
För spolning av ögon (30 ml behållare
rekommenderas)

Dosering

Mängden vätska beror på den kliniska situationen

Överbliven vätska skall kasseras

Återanvändning av engångsprodukter utgör en
potentiell risk för patienten eller användaren. Det
kan leda till kontaminering och/eller nedsättning
av produktens funktion. Om produkten är
kontaminerad och/eller har en begränsad funktion
kan det leda till att patienten skadas, insjuknar
eller dör.

Förvaras oåtkomligt för barn

Aqua B. Braun får inte användas för intratekal
spolning.

Biverkningar

Inga kända

Hållbarhet

Får ej användas efter utgångsdatum på etiketten.

Senast reviderad

0116

Överdosering

Överdosering vid sårrengöring och operativa
ingrepp kan leda till absorption av spolvätska,
som i sin tur kan leda till hypervolemi i form av
hypoton hyperhydrering (hyponatremi)
Huvudvärk, illamående, oro och desorientering
är tecken på hyperhydrering. I allvarliga fall kan
kompliknande tillstånd inträffa

Motåtgärder vid överdosering

Avbryt spolningen, korrigera vatten och
elektrolytbalansen beroende på den kliniska
situationen

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd ej till infusion
Använd endast om förslutningen är obruten och
vätskan klar
Öppnade förpackningar får ej sparas.

Aqua B. Braun

Raztopina za izpiranje,
sterilno in brez endotoksinov

Sestava

1000 ml raztopine vsebuje:
voda za injekcije

1000 ml

tveganje za bolnika ali uporabnika. Povzroči lahko kontaminacijo in/ali slabše delovanje.

Kontaminacija in/ali omejeno delovanje medicinskega pripomočka pa lahko vodita do poškodb, bolezni ali smrti bolnika.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Aqua B. Braun se ne sme uporabljati za postopke intratekalnega izpiranja.

Indikacije

Za izpiranje in čiščenje pri kirurških posegih.
Za izpiranje ran in opekljin.
Za vlaženje gaz, povojev in oblačil na ranah.
Za izpiranje in čiščenje urinskih katetrov.
Za izpiranje in čiščenje pri negi stome.
Za napolnitve respiratornih vlažilnikov zraka.
Za izpiranje in čiščenje instrumentov ter ostalih pripomočkov.

Odmerjanje

Količina uporabljenih raztopin je odvisna od kliničnega stanja.

Škodljivi neželeni učinki

Niso znani.

Rok uporabnosti

Raztopine ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepkah.

Datum zadnje revizije

0116

Preveliko odmerjanje

Prekomerno izpiranje ran in uporaba med operacijo lahko povzročita absorpcijo tekočine in posledično hipervolemijo v obliki hipotonične hiperhidracije (hiponatriemija).
Simptomi hiperhidracije so glavobol, slabost, nemirnost in dezorientacija.
V resnih primerih se lahko pojavi stanje, podobno komi.

Ukrepi v primeru prevelikega odmerjanja

Prenehajte s procesom izpiranja, uravnajte ravnotežje vode in elektrolitov.

Ukrepi in opozorila

Raztopine ne uporabljajte za infundiranje.
Uporabljajte samo bistre raztopine iz nepoškodovanih vsebnikov.
Odprtih vsebnikov ne smete shranjevati, morebitno neporabljeno raztopino zavrzite.
Ponovna uporaba medicinskih pripomočkov, namenjenih enkratni uporabi, predstavlja

SK – Informácia pre používateľa

Aqua B. Braun

Roztok na výplach,
sterilné, bez obsahu endotoxínov

Zloženie

1000 ml roztoku obsahuje:

Voda na injekciu

1000 ml

Otvorené obaly neskladovať a nepoužitý obsah musí byť znehodnotený.

Opakovaným používaním jednorazových zariadení vzniká možné riziko pre pacienta alebo používateľa. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti zariadenia. Kontaminácia alebo obmedzená funkčnosť zariadenia môžu viest' k zraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta. Uschovávať mimo dosahu detí!

Aqua B. Braun sa nesmie používať na intratekálnu aplikáciu.

Indikácie

Na výplach a čistenie počas chirurgických zákrokov

Na výplach rán a popálenín

Na zvlhčovanie tamponád a obvázov rán

Na premývanie a čistenie balónikových katétrov

Na výplach a čistenie pri starostlivosti o stomiu

Na výplach a čistenie nástrojov a zariadení

Ako náplň do zvlhčovačov vzduchu (odporúča sa použiť balenie s obsahom 100 ml alebo viac)

Na mechanický výplach očí (odporúča sa použiť balenie s obsahom 30 ml)

Dávkovanie

Množstvo tekutiny závisí na klinických podmienkach.

Nežiaduce účinky

Žiadne nie sú známe.

Čas použiteľnosti

Roztok nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Dátum poslednej revízie textu

0116

Predávkovanie

Predávkovanie počas výplachu rán a pri aplikácii počas operácie môže viest' k vstrebávaniu roztoku na výplach, čo môže mať za následok hypervolémiu vo forme hypotonickej hyperhydratácie (hyponatriémia). Príznaky hyperhydratácie sú bolesti hlavy, nevoľnosť, nepokoj a dezorientácia. Len zriedka sa môže vyskytnúť stav podobný kóme.

Prvá pomoc v prípade predávkowania

Prerušíť výplach, upraviť vodu a rovnováhu elektrolytov v závislosti na danej klinickej situácii.

Varovania a preventívne opatrenia

Nepoužívať na infúziu.

Používať iba ak je roztok číry a v nepoškodenom obale.

75/12610272/0418

€ 0123

B|BRAUN



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany